ゆめちから栽培研究 プログラム 最終報告

2015年9月23日（水）

麗澤瑞浪高校

自然科学部

目的

収穫量を増やすためには分けつ数を増やす必要が有る

→分けつ数を増やすために基肥を増やす

起生期は葉肥を抑えるため1.5倍

ゆめちからはタンパク質（グルテン）が多い

→止葉期でタンパク質を増やしたい

→2倍では肥料負けするのでは？

→新たな結果を求めて

今までの施肥計画の中間を取った

→止葉期の施肥量 1.5倍

今回の実験では・・・

肥料

☆ 硫安(窒素肥料)

ポイント

☆ 与えるタイミング

☆ 量

起生期: 穂数確保
幼穂形成期: 穂を強くする

止葉期: 粒を太らせる
止葉期後半: グルテン増加

量

質

施肥計画

表 プランター当たりの硫安量

	基肥 (g)	起生期 (g)	止葉期 (g)	総窒素量 (g)
基準区	10	18	12	40
研究区	17.5	27	18	62.5

The background of the image is a blurred landscape. In the foreground, there is a field of golden-brown crops, likely wheat, which is out of focus. Behind it is a strip of green grass, also blurred. In the far distance, a line of trees and a tall, dark, cylindrical structure, possibly a tower or monument, are visible against a light sky.

ゆめちからの成長過程

北海道と瑞浪（恵那）の平均気温

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
帯広	-7.5	-6.2	-1	5.8	11.1	14.8	18.3	20.2	16.3	10	3.2	-3.7
恵那	1	1.9	5.8	11.8	16.6	20.6	24.2	25.3	21.5	15	8.8	3.3

- ①起生期（3月頃）：北海道→4月中旬
- ②止葉期（3月頃）：北海道→5月中旬
- ③出穂期（4月頃）：北海道→6月上旬
- ④収穫期（6月頃）：北海道→7月下旬～8月上旬

麗澤瑞浪の月ごとの気温の変化

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
気温	16	14.4	2.8	9	7.9	14.2	19.3	28.6
最高気温	27.4	25.2	13.7	17.8	16.5	20.7	25.8	32.7
最低気温	13.8	8.6	-0.5	-1.2	-1.1	4.1	9.9	14.3

麗澤瑞浪と北海道の気温の変化

瑞浪での ゆめちからの 生育

- ①起生期 (3月頃) : 2月26日~
- ②止葉期 (3月頃) : 4月16日~
- ③出穂期 (4月頃) : 4月25日~
- ④収穫期 (6月頃) : 6月6日~6月8日

生育状況

基準区 3

研究区 3

2/25

生育状況

基準区 3

研究区 3

3/9

生育状況

基準区 3

研究区 3

3/16

生育状況

基準区 3

研究区 3

3/24

生育状況

基準区 3

研究区 3

3/30

生育状況

基準区 3

研究区 3

4/6

生育状況

基準区 3

研究区 3

4/13

生育状況

基準区 3

研究区 3

4/18

生育状況

基準区 3

研究区 3

4/23

生育状況

基準区 3

研究区 3

5/2

生育状況

基準区 3

研究区 3

5/9

生育状況

基準区 3

研究区 3

5/23

生育状況

基準区 3

研究区 3

5/30

生育状況

基準区 3

研究区 3

2/25

生育状況

基準区 3

研究区 3

3/9

生育状况

基準区 3

研究区 3

3/16

生育状况

基準区 3

研究区 3

3/24

生育状况

基準区 3

研究区 3

3/30

生育状况

基準区 3

研究区 3

4/6

生育状况

基準区 3

研究区 3

4/13

生育状况

基準区 3

研究区 3

4/18

生育状况

基準区 3

研究区 3

4/23

生育状况

基準区 3

研究区 3

5/2

生育状况

基準区 3

研究区 3

5/9

生育状况

基準区 3

研究区 3

5/23

生育状况

基準区 3

研究区 3

5/30

子実の成長

土壤窒素の推移

土壤硝酸態窒素 (ppm)

播種後日数

追肥

■ 基準区 ■ 研究区

草丈の推移

草丈

播種後日数

— 基準区 — 研究区

分けつ数の推移

分けつ数

播種後日数

— 基準区 — 研究区

収穫結果

	全重量 (g)	粉重量 (g)	ふすま重量 (g)	製粉歩留 (%)	タンパク質含量 (%)	穂数 (本/プラン ター)	穂数 (本/m ²)
基準区	390.1	223.8	142.1	61.2	14.1	294.7	727.5
研究区	362.6	213.2	132.9	61.6	13.9	333	822.2

研究のまとめ

- ▶ はじめの計測から一か月で窒素がかなり流出してしまった。
→ 追肥をしたが一週間後の測定では窒素含有量はさほど増えなかった。
- ▶ 追肥をしてから急激に両方とも成長し、それにともない分けつ数が増えた。また、差がほとんどなかった。
- ▶ 分けつ数を増やすことには成功したが、枯れてしまい激減してしまった。（研究区のほうが多く残った。）
- ▶ 研究区は粒が小さかった。

今回の研究の考察

- ▶ 初めの計測から一か月で窒素がかなり流出してしまった。
 - 雨が多かったから。
- ▶ 追肥をしたが一週間後の測定では窒素含有量はさほど増えなかった。
 - 雨で肥料が流された。また、地中に根が十分に張っていてすぐに窒素を吸収した。
- ▶ 追肥をしてから急激に成長し、それにともない分けつ数が増えた。
 - 追肥は分けつ数を増やすため使われた。
 - 予想では追肥によりたんぱく質が増えるとなっていたが、増えていないので、もう少しタイミングをずらせば、たんぱく質の含有量を増やすことに使われるのか？

- ▶ 追肥により、分げつ数を増やすことには成功したが、最終的に枯れてしまい激減してしまった。
 - 分げつ数を増やすために栄養を使った？
- ▶ 研究区は粒が小さかった。
 - 分げつ数が増えたから。
 - 粒一つ一つを大きくしたほうがいい？
- ▶ ゆめちからのたんぱく質含有量が基準に達しなかった。
 - 追肥をした後も肥料が流れて窒素含有量が増えなかった。

今後について

- ▶ 窒素の流出をどうやって抑えるか。
- ▶ 追肥を与えるタイミングによってたんぱく質の含有量や分げつ数はどう変化するのか。
- ▶ 粒を大きくするにはどのようにすればよいのか。

研究を継続したいです！！

ご清聴ありがとうございました